

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eraquell Tabs 20 mg rágótabletta lovaknak A.U.V.

## 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és gyártó:

VIRBAC– 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 CARROS – Franciaország

## 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Eraquell Tabs 20 mg rágótabletta lovaknak A.U.V.

## 3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 Eraquell rágótabletta (3300 mg) tartalmaz:

Ivermektin .....20 mg

Fehér, kerek, bikonkáv tabletták barna pöttyökkel.

## 4. JAVALLAT(OK)

Lovak az alább felsorolt fonálféreg kifejlett példányai és különböző fejlődési stádiumú lárvái, valamint izeltlábúak által okozta vegyes fertőzöttségének parazitaellenes kezelésére.

### Fonálféreg

Nagy strongylidák:

*Strongylus vulgaris* (kifejlett féreg és az artériákban vándorló lávák)

*Strongylus edentatus* (kifejlett féreg és a szövetekben vándorló L<sub>4</sub> lárvák)

*Strongylus equinus* (kifejlett féreg)

*Triodontophorus* spp. (kifejlett féreg)

Kis strongylidák:

Cyathostomum: *Cylicocycclus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Gyalocephalus* spp. (ivarérett és a nem hipobiotikus, mukozális lárvák)

Parascaris: *Parascaris equorum* (kifejlett féreg és lárva)

Oxyuris: *Oxyuris equi* (kifejlett féreg és lárva)

Trichostrongylus: *Trichostrongylus axei* (kifejlett féreg)

Kétszárnyúak: *Gasterophilus* spp. (lárva)

## 5. ELLENJAVALLATOK

Nem adható 2 hetesnél fiatalabb csikóknak.

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyaggal szembeni ismert túlérzékenység esetén.

## 6. MELLÉKHATÁSOK

Nagyon ritkán a kezelés után fellépő kólikás tünetekről, hasmenésről és anorexiáról számoltak be, különösen erős féregfertőzöttség esetén. Nagyon ritkán allergiás tünetek - például nyálzás, nyelvödéma, csalánkiütés, tachycardia, a nyálkahártyák vérbősége és bőr alatti ödéma - alakultak ki a termék alkalmazását követően.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, az alkalmazási utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

## 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Ló

**8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

Szájon át alkalmazandó, egyszeri alkalommal.

200 µg ivermektin/ttkg, ami megfelel 1 tablettát/100 ttkg-nak.

Testtömeg	Adag	Testtömeg	Adag
100 kg-ig	1 tablettát	501-600 kg	6 tablettát
101-200 kg	2 tablettát	601-700 kg	7 tablettát
201-300 kg	3 tablettát	701-800 kg	8 tablettát
301-400 kg	4 tablettát		
401-500 kg	5 tablettát		

**9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT**

Az adagolás pontossága érdekében a kezelés előtt az állat testtömegét a lehető legpontosabban határozzuk meg.

Ha meghatároztuk a pontos adagot, a következőképpen alkalmazzuk a készítményt:

Tegyük a tablettát a tenyerünkbe és így kínáljuk a lónak, míg a teljes adagot el nem fogyasztotta. A tablettákat egyszerre, és külön-külön is beadhatjuk. Kezdetben kevés eseléssel vagy jutalomfalattal kombinálva adhatjuk, így a ló szívesebben elfogadja.

Ha a ló nem fogyasztotta el a megfelelő adagot, válasszunk más kezelési módot. Ehhez kérjük állatorvos segítségét.

A megfelelő adagolás, valamint az állomány fonálféreg- és ízeltlábú-ellenes kezeléséhez kérjük az állatorvos segítségét.

**10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Ló (ehető szövetek): 35 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő kancák kezelésére nem engedélyezett.

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Különleges tárolást nem igényel.

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül lehet felhasználni.

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 12 hónapig.

**12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)****Különleges figyelmeztetések az állatokon való alkalmazáshoz**

Az ivermektinre való intolerancia előfordulhat egyes nem célállat fajokban. Intoleranciát jelentettek kutyák (elsősorban skót juhász, bobtail, illetve a rokon és keresztezett fajták), valamint vízi és szárazföldi teknősök esetében. Az ivermektin mérgezés megelőzése érdekében nem szabad megengedni, hogy a kutyák vagy a macskák lenyeljék a tablettákat, vagy hozzáférhessenek a felbontott csomagoláshoz.

50 kg alatti fiatal csikóknál illetve, törpe lovaknál előfordulhat, hogy nem veszik be a tablettát. Ilyen esetekben ki kell kérni az állatorvos tanácsát.

**A felhasználó figyelmébe**

Alkalmazás után alaposan mossunk kezet. Kerüljük a készítmény szembe jutását. Szemirritáció esetén forduljunk orvoshoz.

A kezelés során dohányozni, enni és inni tilos. Véletlen lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni, bemutató a készítmény használati utasítását.

**Különleges figyelmeztetések az egyes célállat fajokra vonatkozóan**

A következő esetekben fokozódik a rezisztencia kialakulásának veszélye, ami a kezelés sikertelenségét okozhatja:

- Azonos csoporthoz tartozó anthelmintikumok gyakori, ismételt használata, hosszú időn keresztül.
- Aluldozírozás, ami a testtömeg alulbecsléséből, a nem megfelelő gyógyszerbeadásból vagy az adagolóeszköz (ha van) kalibrálásának hiányából származhat.

Az anthelmintikumokkal szembeni rezisztencia gyanúja esetén kiegészítő vizsgálatokat kell végezni (pl. a bélsárral ürített peték számának csökkenését vizsgálva). Ha az eredmény(ek) megerősíti(k) a rezisztencia gyanúját egy bizonyos anthelmintikummal szemben, egy másik hatástani csoportba tartozó, más hatásmechanizmusú szert kell alkalmazni.

Lovak *Parascaris equorum* parazitájának ivermektinnel szembeni rezisztenciájáról már beszámoltak. Ezért ezt a készítményt a fonálférgék gyógyszerérzékenységére vonatkozó helyi (regionális, telepi) járványtani információk és az anthelmintikumokkal szembeni rezisztencia további terjedését megakadályozó ajánlások alapján kell alkalmazni.

A készítmény biztonságosan alkalmazható tenyészcsődörök esetében.

**Túladagolás**

A készítménnyel végzett tolerancia vizsgálatok során, felnőtt lovakat az ajánlott dózis ötszörösével kezelve sem jelentkeztet mellékhatás.

Prazikvantelt és ugyanilyen dózisu ivermektint tartalmazó készítménnyel, (EQUIMAX belsőleges gél) végzett tolerancia vizsgálatok során kancákat, méneket, csikókat kezeltek. A kancákat a készítmény javasolt dózisának háromszorosával, 14 napos időközzel, a vemhesség, valamint a laktáció teljes időtartama alatt kezelték. Vetélés nem fordult elő, káros hatást nem észleltek a vemhesség alatt és az ellés utáni időszakban, illetve a kancák általános állapotában sem jelentkeztet rendellenességek.

Tenyészcsődöröket a javasolt dózis háromszorosával kezeltek. Az állatok általános állapotára és szaporodásbiológiai teljesítményére vonatkozó káros hatás nem volt megfigyelhető. Csikókat a javasolt dózis ötszörösével kezeltek, és a csikók általános állapotában nem jelentkeztet rendellenességek.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. HALAKRA ÉS VÍZI ÉLŐLÉNYEKRE KIFEJEZETTEN VESZÉLYES, a készítmény vagy csomagolóanyaga nem kerülhet természetes vizekbe.

**14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2010. március 11.

**15. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

1, 2, 12, 40 vagy 48 db, egyenként 8 db tablettát tartalmazó, gyermekzárral ellátott polietilén tubust tartalmazó doboz.

Előfordulhat, hogy nem minden kiserelés kerül kereskedelmi forgalomba.

