

Használati utasítás
Duowin Contact oldat A. U.V.

Adulticid és ovocid hatású bolha és kullancs elleni oldat külső használatra

Összetétel:	permetrin	0,4 g
	pyriproxyfen	3 mg
	Segéd és vivőanyag	ad 1 ml.
Gyógyszerforma:	Oldat külsőleges használatra (spot-on)	
Javallat:	Permetrinre és pyriproxyfenre érzékeny külső paraziták okozta fertőzések kezelésére. Bolha és kullancs okozta fertőzések gyógykezelésére és megelőzésére 4 hetes időtartamra. A bolha szaporodás megelőzésére 8 hetes időtartamra, gátolva az éretlen fejlődési stádiumok felnőtt formává való alakulását.	
Gyártó/törzskönyvi engedélyes:	VIRBAC S.A. L.I.D. (1 ^{ère} Avenue-2065 m, 06516 Carros, Franciaország)	
Célállat:	Kutya	
Alkalmazás módja:	Külsőleg	
Adagolás:	A Duowin Contact A.U.V. készítmény 2-4- 8 ml-es pipettákban kerül kiszerezésre. 0,50 ml Duowin Contact/ttkg, ami egyenértékű 200 mg permetrinnel és 1,6 mg pyriproxyfen /ttkg Ezt a következő adagolásokkal érhetjük el: kistestű kutya <7,5 kg 1 db 2 ml-es pipetta közepes testű kutya 7,5 kg -15 kg 1 db 4 ml-es pipetta nagytestű kutya: 15 kg-30 kg 1 db 8 ml-es pipetta nagyon nagy testű kutya: >30 kg 2 db 8ml-es pipetta	
Alkalmazási útmutató:	A parazita elleni kezelés hatékonysága a termék pontos alkalmazásától függ. A készítmény alkalmazása a következő módon történjék: A pipettát közvetlenül a kezelés előtt nyissuk ki. Tartsuk álló helyzetben, majd a lepkeshárny alakú védőkupak tengely körüli elfordításával törjük le a kupakot. A készítményt közvetlenül a hát bőrére vigyük fel, a farktól kiindulva a nyak irányába. Ügyeljünk arra, hogy kizárólag a bőrön maradjon a készítmény a dorsalis vonal mentén. Időnként mérsékelt nyomást gyakoroljunk a pipettára. Ha a pipettában maradt oldat, azt a farktő és a lapocka tájékra vigyük fel <u>olyan helyre, hogy az állat ne tudja lenyalni</u> . A készítményt az állaton hagyjuk természetes módon megszáradni.	
Ellenjavallat:	Nem használható macskán. Nem használható két hónaposnál fiatalabb és 2 kg-nál kisebb súlyú állaton Nem használható beteg vagy lábadozó állaton. Nem használható szoptató szukákon.	
Nemkívánatos hatás:	Nem ismert. Az állatok az ajánlott dózis szerinti kezelést jól tűrik. Ha mégis az intolerancia jelei mutatkoznak, bő vízzel fürdessük meg az állatot.	
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:	Élelmiszer termelő állaton nem alkalmazható.	
Tárolás:	Eredeti csomagolásban szobahőmérsékleten (15-25 °C között) tartandó. Hőforrásoktól távol tartandó.	
Figyelmeztetés:	Gyermektől elzárva tartandó. Csak külső használatra. Kizárólag állatok kezelésére.	
Munkavédelmi óvórendszabályok:	Kerülni kell, hogy a készítmény, a kezelő szemébe vagy bőrére kerüljön. Étetől, italtól a készítményt távol kell tartani. Gyermeknek ne engedjük, hogy játszanak a termékkel. A készítmény alkalmazásakor gumikesztyű használata kötelező!	

A bőrre vagy szembe jutott készítményt bő vízzel mossuk le. Kezelés után mossunk kezet.

Eltarthatóság:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 24 hónapig, a csomagoláson feltüntetett időpontig.
Rendelhetőség:	Csak állatgyógyászati rendelvényre. Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.
Forgalmazhatóság:	Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.
Kiszereles:	Dobozba helyezett 2, 4, 8, ml űrtartalmú pipettákban, amelyek a következő elosztásban kerülnek a dobozokba: Duowin Contact kistestű kutya < 7,5 kg - 1 db 2 ml-es dobozba helyezett pipetta - 2 db 2 ml-es dobozba helyezett pipetta - 3 db 2 ml-es dobozba helyezett pipetta - 4 db 2 ml-es dobozba helyezett pipetta Duowin Contact közepes testű kutya 7,5-15 kg - 1 db 4 ml-es dobozba helyezett pipetta - 2 db 4 ml-es dobozba helyezett pipetta - 3 db 4 ml-es dobozba helyezett pipetta - 4 db 4 ml-es dobozba helyezett pipetta Duowin Contact nagy testű kutya 15-30 kg - 1 db 8 ml-es dobozba helyezett pipetta - 2 db 8 ml-es dobozba helyezett pipetta - 3 db 8 ml-es dobozba helyezett pipetta - 4 db 8 ml-es dobozba helyezett pipetta Duowin Contact nagyon nagy testű kutya >30 kg - 4 db 8 ml-es dobozba helyezett pipetta
Törzskönyvi szám:	1287/2001. FVM
Környezetvédelmi előírások:	A készítmény veszélyes a halakra és rákokra, ezért a terméket és annak csomagolóanyagát ne dobjuk élő vizekbe, víztározókba. Közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból a készítmény fel nem használt maradékát, valamint a kiürült csomagolóanyagokat és tárolóedényzetet a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályok szerint kell megsemmisíteni.