

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Duowin A.U.V. permet kutyák részére

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag: Permetrin (cis:trans 40:60) (94 %) 1,88 g, piriproxifen 0,02 g

Segéd-, és vivőanyagok: filmképző organikus kopolimer, propilén glikol metiléter, parfüm, tisztított víz ad 100 ml. A hatóanyagok koncentrációja: permetrin 2 %, a piriproxifen 0,02 %.

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

Virbac S. A. (1 ére Avenue L.I.D. 2065 m 06516 Carros, Franciaország).

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

5. JAVALLATOK

Kutyák bolha- (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) és kullancs (*Dermacentor*, *Ixodes*, *Rhipicehalus* fajok) fertőzöttségének kezelésére és megelőzésére.

6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Alkalmazás módja: külsőleges.

A kutya testtömege	3 kg	7 kg	10 kg	15 kg	20 kg	30 kg	40 kg
A szórófejjel végzett permetezések száma	5	12	17	25	34	50	67

Az előzetesen rögzített állat teljes testfelületét permetezzük le a szőr növekedésével ellentétes irányból. A mellékelt szórófejjel 5 ml oldat adagoljunk ttkg-onként, ami egyenértékű 94 mg (100 mg technikai minőségű) permetrin / ttkg-mal, és 1mg piriproxifen/ttkg-mal. Öt pumpa nyomást alkalmazzunk 3 ttkg-ra, az adagolást a táblázatnak megfelelően végezzük. A pumpa egy nyomással 3,2 ml permetet juttat ki.

7. ADAGOLÁS - ÉS ALKALMAZÁSMÓDOK

Hatékony védelem akkor érhető el, ha a teljes szőrtakaró átázik. Masszírozzuk be a készítményt az állat szőrébe, főleg a hosszú szőrű állatoknál, hogy a hatóanyag eljusson a bőrre. A permet vízálló filmréteget képez a bőrön és a szőrzetten, ez segíti a külső élősködők elleni védekezést. Vigyázzunk, hogy a permet ne kerüljön a kutya szemébe, szájába, és ne lélegezze be. Hagyjuk a szőrzetet természetes módon megszáradni, ne öblítsük le, ne töröljük meg. A készítményt tiszta, száraz állatra permetezzük, ezzel növeljük a szer hatékonyságát. A Duowin permet 6 hetes védelmet biztosít a bolha imágók és 4 hetes védelmet a kullancsok ellen. A piriproxifen a bolhák ivaréretté válását a fejlődési alakokra gyakorolt gátló hatással 10 hétig akadályozza meg. Kezelés után az állatokat ne fürdessük, se samponozzuk, ha elkerülhetetlen, akkor ismételtelen permetezzük le a szőrzetet. A bolhák és petéik megtalálhatók a kutya közvetlen környezetében, ezért a kutya tartózkodási és fekvőhelyét rendszeresen takarítsuk, porszívózzuk. Az állatok kezelésével egyidejűleg irtásukra alkalmazzunk inszekticid hatású biocid terméket. Évente három alkalommal biztonságosan alkalmazható készítmény.

8. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A szabadban, vagy jól szellőző helyiségben végezzük a kezelést. Akadályozzuk meg, hogy az állatok a kezelést követően nyalják a bőrüket, szőrüket. A készítmény gyúlékony! Ne permetezzünk nyílt lángra vagy izzó anyagra. A kezelt kutyákat tüztől, vagy más hőforrástól legalább 30 percig, vagy a szőrzet megszáradásáig tartssuk távol. Ne adagoljunk több oldatot a megállapított dózisonál. Ne engedjük, hogy a gyerekek a kezelést követően a kutyával érintkezzenek. Akvárium közelében ne alkalmazzuk.

9. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható macskákon. Nem alkalmazható 2 hónaposnál fiatalabb kutyakölykökön.

Ne használjuk a készítményt, ha az állatokon bőrsérülések vannak. Nem alkalmazható beteg vagy lábadozó állatokon.

10. MELLÉKHATÁSOK

Ritkán izgatottság, vakaródzás vagy hányás, hasmenés, levertség előfordult. Ezek a tünetek kezelés nélkül elmúltak.

11. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Előírása nem szükséges

12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

25 °C alatti hőmérsékleten, sugárzó hőtől védve tartandó. Ha a szórófejet felszereltük, a készítmény csak függőlegesen felállítva tartható. Élelmiszerektől, italoktól távol tartandó.

13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók:

Más inszekticid hatású készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

Túladagolás, tünetek, sürgősségi intézkedések, antidótumok):

Az esetleges túladagolás tünetei a túlérzékenység, a mozgás koordinációjának hiánya, erőteljes bőrpír, hosszan tartó reszketés. Túladagolás esetén samponos vízben fürdesse meg a kutyát, hogy lemossa a készítményt. A hatóanyagoknak nincs speciális ellenszerük.

Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvrendszabályok:

A kezelést végző személy viseljen gumikesztyűt. Ne lélegezze be a permetet. Kerüljük el a permet bőrre, vagy szembejutását. A permetezéskor tilos a dohányzás, az evés, ivás. A készítmény használata után alaposan kezét kell mosni. Ha szembe, vagy bőrre kerül, folyóvízzel bőségesen öblíteni szükséges.

14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. Mérgező méhekre, halakra és más vízi élőlényekre, ezért a készítmény maradékát folyó-, és élővizetekbe engedni tilos.

15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2006. 03. 06.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

16.1. Rendelhetőség

Szabadon forgalmazható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.

16.2. Forgalmazhatóság

16.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság

250 ml és 500 ml nagy sűrűségű polietilén flakonban, egy mechanikus pumpa műanyag szórófejjel a csomagoláshoz mellékelve papírdobozban.

16.4. Törzskönyvi szám

210/1997. FM.