

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE Feligen® CRP vakcina A.U.V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

A vakcina adagja (1 ml) tartalmaz:

Feline rhinotracheitis vírus F2 törzs	min. $10^{5,0}$ TCID ₅₀
Feline calicivírus F9 törzs	min. $10^{4,1}$ TCID ₅₀
Feline panleukopenia vírus DSV törzs	min. $10^{3,0}$ TCID ₅₀
Steril vakcina hígító 1 ml.	

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

Virbac S.A. (L.I.D.-Iére Avenue-2065 m, 06516-Carros, Franciaország)

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Macskák részére.

5. JAVALLAT(OK)

Egészséges macskák aktív immunizálására rhinotracheitis-, calici- és panleukopenia vírus okozta megbetegedés ellen

6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Egy adag (1 ml)/ állat. Alapimmunizálás során két vakcinázás szükséges, a macskakölykök 8-9 hetes életkorában az első oltás, majd az azt követő 21. napon ismételt vakcinázás ajánlott.

Emlékeztető oltások: évente.

7. ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓDOK

Intramuskuláris vagy szubkután alkalmazás.

A liofilezett részt a mellékelt hígítóban kell visszaoldani, és feloldódás után azonnal fel kell használni.

8. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Vemhes állatnak nem adható! Csak teljesen egészséges, parazitáktól mentes és jó általános állapotban lévő macskák olthatóak. Immunszuppresszív szerekkel a vakcinázás előtt és közvetlen utána ne kezeljük az állatokat. Az oltásra steril, fertőtlenítőszer-mentes eszközök használhatóak.

9. ELLENJAVALLATOK

Nem ismeretes.

10. MELLÉKHATÁSOK

A vakcinázás kivételesen hiperszenzitívitási állapothoz vezethet. Ilyen esetben tüneti kezelést kell alkalmazni. Az oltás helyén átmeneti, múló duzzanat jelentkezhet.

11. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Megállapítása nem szükséges. Élelmiszertermelő állatok a készítménnyel nem kezelhetők!

12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Hűtőszekrényben tárolandó ($+2^{\circ}\text{C}\pm 8^{\circ}\text{C}$). Nem fagyasztható. Az eredeti csomagolásban tartandó, hogy a fénytől védjük.

Az állatgyógyászati készítményt a gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Lejáratási idő: 2 év, felhasználható a csomagoláson feltüntetett időpontig.

13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Az általános aseptikus körülményekre figyelemmel kell lenni. Véletlen öninjekciózás esetén a készítmény használati utasításával együtt az orvost haladéktalanul fel kell keresni.

14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2006. április 11.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

16.1 RENDELHETŐSÉG

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.
Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

16.2 FORGALMAZHATÓSÁG

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

16.3 KISZERELÉSI EGYSÉGEK

10 x 1 adag liofilizátum + 10 x 1 folyékony rész üvegben és alufóliával borított dobozban
25 x 1 adag liofilizátum + 25 x 1 ml folyékony rész
50 x 1 adag liofilizátum + 50 x 1 ml folyékony rész

16.4 TÖRZSKÖNYVI SZÁM

246/1992.

16.5 FORGALMAZZA

CEVA-PHYLAXIA Rt., 1107 Budapest, Szállás u. 5.