

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

Virbac S.A. (L.I.D.-1ére Avenue-2065 m, 06516-Carros, Franciaország)

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Feligen® CRP/R vakcina A.U.V.

3. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

A vakcina adagja (1 ml) tartalmaz:

Liofilizált pellet (Feligen® CRP összetevő):

Feline rhinotracheitis vírus F2 törzs $10^{5,0} - 10^{6,6}$ TCID₅₀

Feline calicivírus F9 törzs $10^{4,6} - 10^{6,1}$ TCID₅₀

Feline panleukopenia vírus DSV törzs $10^{3,7} - 10^{4,5}$ TCID₅₀

Oldószer (Rabigen Mono összetevő):

Inaktivált veszettség vírus VP12 törzs min. 3,0 NE

3%-os Alumínium-hidroxid gél 0,1 ml

gentamicin nyomokban

4. JAVALLAT(OK)

Egészséges macskák aktív immunizálására rhinotracheitis-, calici- és panleukopenia vírusok okozta megbetegedések, valamint veszettség ellen.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem ismeretes.

6. MELLÉKHATÁSOK

Az oltást követő 24 óraban átmeneti testhőmérséklet-emelkedés, kedvetlenség lehet megfigyelhető. Esetenként az injekció beadás helyén átmeneti duzzanat jelentkezhet, mely 4 héten belül elmúlik.

A vakcinázás kivételesen hiperszenzitívitási állapothoz vezethet. Ilyen esetben tüneti kezelést kell alkalmazni.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Macska

8. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Egy adag (1 ml)/ állat subcutan.

9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A fiatal állatok immunizálását 8-9 hetes életkorban tanácsos elkezdni a Feligen CRP vakcinával. Az első oltást követő 3. héten ismételjük meg a vakcinázást Feligen CRP/R oltóanyaggal.

Emlékeztető oltások: évente.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Megállapítása nem szükséges. Élelmiszertermelő állatok a készítménnyel nem kezelhetők!

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

+4 - +6 °C között fénytől védve. Fagyástól óvni kell. Gyermekek elől elzárva tartandó!

Eltartható a gyártástól számított 24 hónapig, a csomagoláson feltüntetett időpontig.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Vemhes állatnak nem adható! Csak teljesen egészséges, parazitáktól mentes és jó általános állapotban lévő macskák oltathatók.

Más készítménnyel való együttes alkalmazással kapcsolatos információk nem állnak rendelkezésre, ezért az oltást megelőző és azt követő 7 napig más készítménnyel az állatok nem oltathatók.

Immunszuppresszív szerekkel a vakcinázás előtt és közvetlen utána ne kezeljük az állatokat.

Az oltásra steril, fertőtlenítőszer-mentes eszközök használhatóak.

Az általános aseptikus körülményekre figyelemmel kell lenni. Ember véletlen oltása esetén a készítmény használati utasításával együtt az orvost haladéktalanul fel kell keresni.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményből származó hulladékanyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

15. ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓDOK

Subcutan alkalmazás.

A Feligen CRP összetevőt a Rabigen Mono összetevőben kell visszaoldani, és feloldódás után azonnal fel kell használni.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

16.1 CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEK

10x1 vagy 50x1 adag liofilizátumot (Feligen CRP összetevő) és 10x1 vagy 50x1 adag folyékony komponenst (Rabigen Mono összetevő) tartalmazó injekciós üvegben, alufóliával borított kartondobozban

16.2 RENDELHETŐSÉG

Csak állatorvosi rendelvényre! Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra!

16.3 FORGALMAZHATÓSÁG

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

16.4 TÖRZSKÖNYVI SZÁM

2225/1/07 MgSzH ÁTI (1 adag)