

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Vitaminthe féreghajtó paszta A.U.V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

10 ml paszta tartalmaz:

Hatóanyagok:

Niklozamid	2,4 g
Oxibendazol	0,3 g

Segéd- és vivőanyagok:

Nátrium-biszulfít, benzalkonium-bromid, dekvalinium, xantán gumi, nátrium-polinaftalin-szulfonát, dimetikon, nátrium-ciklamát, szardellás só (íz javító), habzásgátló, tisztított víz

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

Virbac S.A. (L.I.D.-1^{ère} Avenue-2065 m, 06516-Carros, Franciaország)

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya, macska.

5. JAVALLAT(OK)

Orsóférgesek, fonálférgesek és galandférgesek okozta fertőzöttség gyógykezelésére. Hatékony az alábbi fajok ellen:

Toxocara spp., *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria stenocephala spp.*, *Dipilydium caninum*,

Taenia spp.

6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A készítmény általános adagja 0,5 ml/ttkg. A pontos adagolást a fecskendő dugattyúján lévő skála segíti, egy osztás 1 ml-nek felel meg.

A fiatal állatokat 6 és 12 hetes kor között kétszer kell kezelni 1 hónapos különbséggel.

A felnőtt állatokat ajánlott évente kétszer kezelni.

A nőivarú egyedeket vemhesítéskor, 1 héttel kölykezés előtt és 3-4 héttel a kölykezés után kell kezelni.

A pasztát közvetlenül az állat nyelvére vagy eledelbe keverve lehet adni.

7. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)

Szájon át.

8. ELLENJAVALLATOK

Nem ismertek.

9. MELLÉKHATÁSOK

Hányinger, hányás, hasmenés előfordulhat.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 18 hónapig.

Az eredeti csomagolásban, 25°C alatt tárolandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Vemhes állatokon történő alkalmazás esetén különösen fontos a pontos adagolás betartása.

A kezelést követően az állatok a férgeseket a bélsárral ürítik, ezért a fertőzött bélsarat össze kell gyűjteni és megsemmisíteni. A kezelést követő napokban a gyermekeket tartsuk távol a kezelt állattól.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2006-02-20

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselőjéhez.

15.1. Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

15.2. Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

15.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság

5, 10, 25 ml-es polietilén fecskendő papírdobozban.

15.4. Törzskönyvi szám

863/1998. FVM