

Használati utasítás

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Equimax A.U.V. gél szájon át lovaknak

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 gramm Equimax tartalmaz:

Hatóanyag(ok)

Ivermektin 18.7 mg
Prazikvantel..... 140.3 mg

Vivóanyag(ok)

Titán dioxid (E171) 20 mg
Propilén glikol..... 731 mg

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Virbac de Portugal Laboratorios LDA

Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Porta 2 2080-104 Almeirim, Portugália

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Ló

5. JAVALLAT(OK)

Lovak a felsorolt galandférgek, fonalférgek kifejlett példányai és különböző fejlődési stádiumú lárvái, valamint ízeltlábúak lárvái által okozott fertőzöttségének kezelésére:

♦ Fonalférgek

Nagy-strongylidák:

Strongylus vulgaris (adult és az artériákban vándorló lávák)

Strongylus edentatus (adult és a szövetekben vándorló L₄ lárvák)

Strongylus equinus (adult)

Kis-strongylidák:

Triodontophorus spp. (adult, Cyathostomum: *Cylicocycclus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Cylicodontophorus* spp.,

Gyalocephalus spp. (ivarérett és a nem hipobiotikus, mukozális lárvák).

Parascaris: *Parascaris equorum* (adult és lárva).

Oxyuris: *Oxyuris equi* (Lárva).

Trichostrongylus: *Trichostrongylus axei* (adult).

Strongyloides: *Strongyloides westeri* (adult).

Habronema: *Habronema* spp. (adult),

Onchocerca: *Onchocerca* spp. mikrofilária bőr onchocercosis

♦ **Tüdőféreg:** *Dictyocaulus arnfieldi* (adult).

♦ **Galandférgek:** *Anoplocephala perfoliata*, *Anoplocephala magna*, *Paranoplocephala mamillana*.

♦ **Kétszárnyúak, lóbagócsók:** *Gasterophilus* spp. (Lárva)

Mivel csikókban a galandféreg fertőzöttség nem jelentkezik 2 hónapos kor előtt, két hónapos kor alatti csikók kezelése nem szükséges.

6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Adagolás: egyszeri adagolás.

200 µg ivermektin és 1.5 mg prazikvantel ttkg, ami megfelel 1.07 g paszta/100 ttkg.

Kezelés előtt az állat testtömegét és a dózist pontosan határozzuk meg.

Testtömeg	Adag	Testtömeg	Adag
100 kg-ig	1.070 g	401-450 kg	4.815 g
101-150 kg	1.605 g	451-500 kg	5.350 g
151-200 kg	2.140 g	501-550 kg	5.885 g
201-250 kg	2.675 g	551-600 kg	6.420 g
251-300 kg	3.210 g	601-650 kg*	6.955 g
301-350 kg	3.745 g	651-700 kg*	7.490 g
351-400 kg	4.280 g		

*Csak a 7.49 g-os fecskendő

Az első osztás 100 testtömeg kilogramm kezelésére elegendő. Minden további osztás 50 testtömeg kilogramm kezelésére elegendő. Az előre kiszámított adagot az adagoló fecskendőn lévő gyűrűvel állíthatjuk be.

A 6,42 g pasztát tartalmazó adagoló fecskendő 600 ttkg ló előírt dózisu kezelésére elegendő.

A 7,49 g pasztát tartalmazó adagoló fecskendő 700 ttkg ló előírt dózisu kezelésére elegendő.

7. ADAGOLÁS - ÉS ALKALMAZÁSMÓD (OK)

Alkalmazás előtt a gyűrű segítségével állítsuk be a fecskendő dugattyúján a kiszámított dózist. A pasztát szájon át, az oldalsó foghíjas részen helyezzük be az üres, takarmányt nem tartalmazó szájúregbe. Nyomjuk a pasztát a nyelv hátára, majd azonnal emeljük fel néhány másodpercre az állat fejét, amíg megbizonyosodunk róla, hogy lenyelte az adagot. Kérje állatorvosa segítségét a megfelelő adag kiszámításához, valamint az állomány parazitás fertőzöttségének ellenőrzéséhez, a megfelelő kezelési program összeállításához.

8. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Biztonságosan használható vemhes és szoptató kancában.

9. ELLENJAVALLATOK

Ne adjuk 2 hetesnél fiatalabb csikóknak. Emberi fogyasztásra tejet termelő lovaknak nem adható.

10. MELLÉKHATÁSOK

*Onchocerca microfilaria*kkal nagymértékben fertőzött lovak esetében a kezelés után duzzanat, viszketés fordult elő. Feltételezték, hogy a reakciók a nagy mennyiségben elpusztuló mikrofiláriák következtében alakultak ki. Súlyos féregfertőzöttség esetén a paraziták pusztulása átmeneti kólikát, hasmenést okozhat a kezelt lovakban. Ha a tünetek nem múlnak el, forduljon állatorvoshoz.

11. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Ló (ehető szövetek): 35 nap. Emberi fogyasztásra tejet termelő lovaknak nem adható.

12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

30 °C alatt tartandó. A felbontott fecskendő 25 °C alatt tárolandó.

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Lejáratási idő: 2 év. A fecskendő első felbontása után 6 hónap.

13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS (EK)

Az állatokra vonatkozó figyelmeztetések:

Az avermektineket a nem célállat fajok általában nem jól tolerálják. Intoleranciát jelentettek kutyáknál pl. a skót juhász, a bobtail, illetve a rokon és keresztezett fajták, valamint a tengeri teknőcök és a szárazföldi teknősbékák esetében. Az ivermektin mérgezés megelőzése érdekében nem szabad megengedni, hogy a kutya vagy macska lenyelje a készítményt, vagy érintkezzen annak használt csomagolóanyagával.

Az ivermektin kifejezetten mérgező halakra és a vízi élőlényekre, ezért az állatokat a kezelés ideje alatt tartsuk távol a természetes vizektől. Az anthelmintikumok gyakori, ismételt használatát követően rezisztencia alakulhat ki a parazitákban.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok:

Alkalmazás után alaposan mossunk kezet, hogy elkerüljük a készítmény szemmel történő érintkezését. Kerüljük el a szembejutást. A termék szembe kerülése esetén bőséges vízzel mossuk ki a szemet. Szem irritáció esetén forduljunk szemorvoshoz. Kezelés közben ne együnk, igyunk, vagy dohányozzunk. Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását, vagy címkéjét.

14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. Halakra és a vízi élőlényekre kifejezetten veszélyes, élővizekbe, tavakba, vízfolyásokba a készítmény, vagy csomagolóanyaga nem kerülhet.

15. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2005. december 16.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

16.1. Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

16.2. Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

16.3. Kiszerezési egységek

1, 2, 12, 40, 48 fecskendőt tartalmazó doboz. Egy fecskendő 6,42 vagy 7,49 g-os buborék csomagolásban.

16.4. Törzskönyvi szám:

1495/2005. FVM.