

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS Packing insert**

### **1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**

Prostavet-C injekció A.U.V.

### **2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

2 ml oldat tartalmaz:

**Hatóanyag:**

Etiproston: 5 mg

**Segéd- és vivőanyagok:**

Nátrium-metil-parahidroxibenzóát, nátrium-propil-parahidroxibenzóát, nátrium-klorid, víz  
parenterális célra.

### **3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL**

Virbac S.A. (L.I.D.-1<sup>ère</sup> Avenue-2065 m, 06516-Carros, Franciaország)

### **4. CÉLÁLLAT FAJOK**

Szarvasmarha.

### **5. JAVALLAT(OK )**

Luteolyticus és uterotonicus hatása következtében az etiproston a következő célokra lehet felhasználni:

- vetelés kiváltása a vemhesség 7. napja után
- luteolysis kiváltása korai magzatelhalást és resorptiot követően
- ivarzás szinkronizálás, ivarzás kiváltás
- ellésindukció a vemhesség 270. napja után
- idült méhgyulladás, pyometra kezelése

### **6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

A készítményt általában elég egyszer alkalmazni. Az egyszeri adag 5 mg etiproston, ami megfelel 2 ml Prostavet-C injekció A.U.V.-nek. Ha a kezelés után az ivarzás 7 napon belül nem következik be, szükség van másodszori kezelésre az első kezelés után 11 nappal, majd 72 órával és 96 órával később kétszer kell az állatot termékenyíteni.

### **7. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)**

Intramuscularis alkalmazás.

### **8. ELLENJAVALLATOK**

Vemhes teheneknek csak akkor adható, ha ellés/vetelés kiváltása a cél.

A készítmény alkalmazása ellenjavallt gastrointestinális, légző- és keringésszervi betegségek esetén.

### **9. MELLÉKHATÁSOK**

Bélgörcsök, hasi fájdalom, hasmenés, szapora és/vagy nehezített légzés, szaporább pulzus, izzadás, nyálzás előfordulhat.

### **10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Szarvasmarha ehető szövetek: 2 nap

Tehéntej: 0 nap

## **11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!  
Az eredeti csomagolásban, legfeljebb 25°C-on tárolandó.  
Felhasználható a gyártástól számított 3 évig.

## **13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**

### **13.1 Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók**

A készítmény nem alkalmazható együtt nem-szteroid gyulladásgátlókkal.  
Oxítocinnal, ergometrinnel együtt alkalmazva hatásfokozódás mutatkozik.

### **13.2 Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok**

Az etiproston a bőrről gyorsan és jól felszívódik, ezért a készítmény alkalmazása során gumikesztyű viselése ajánlott. Ha a szer a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni.  
A készítményt szülőképes korban lévő nők valamint asztmás vagy egyéb légzőszervi betegségben szenvedő egyének nem alkalmazhatják.

## **14. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

## **15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2006-02-20

## **16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselőjéhez.

### **16.1. Rendelhetőség**

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

### **16.2. Forgalmazhatóság**

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

### **16.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság**

10 darab 2 ml-es gumidugós, alumínium kupakos üveg papírdobozban.

### **16.4. Törzskönyvi szám**

382/1991. FVM