

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Neo Mastitar tőgyinfúzió A.U.V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyagok:

benzilpenicillin-prokain 500 mg (500,000 NE)
neomicin bázis (szulfát alakjában) 300 mg

Segéd- és vivőanyagok:

alumínium-trisztearát
higan folyó paraffin ad 8000 mg

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

Virbac S.A. (1^{ère} Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Franciaország)

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha

5. JAVALLAT

Tehenek tőgygyulladásának gyógykezelésére és megelőzésére a szárazonállás idején.

6. ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)

Intramammális alkalmazásra.

1 db intramammális fecskendő / tőgynegyed az utolsó fejés után és legalább 5 héttel az ellés ideje előtt.

7. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Az utolsó fejés után kell alkalmazni.

Használat előtt felrázandó.

1. Az utolsó fejéskor a tőgynegyedet teljes mértékben kifejjük.
2. A csecsbimbót megtisztítjuk és fertőtlenítjük.
3. A zárókupak eltávolítása után a fecskendő hegyét a bimbócsatornába vezetjük és teljes tartalmát a tőgynegyedbe fecskendezzük.
4. A fecskendő kihúzása után felfelé irányuló finom masszírozással a szuszpenziót a tőgynegyedben eloszlatjuk

8. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival, vagy bármely segédanyaggal vagy vivőanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

Laktáció ideje alatt nem alkalmazható.

9. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismeretes.

Ha nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha (ehető szövetek): 49 nap

Tehéntej: A kezeléstől számított 40 nap (az ellés után szükséges 5-8 nap várakozási idő betartandó!)

Tejelő teheneknek nem adható.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

15-25°C között, fénytől védve tárolandó.

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény lejárati ideje: 5 év

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

12.1 Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók

Bakteriosztatikus készítményekkel egyidejűleg nem alkalmazható.

12.2 Túlادagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok) (ha szükséges)

Nem ismeretes.

12.3 Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok.

A penicillinre és neomicinre ismerten túlérzékeny személyek a készítménnyel nem dolgozhatnak. Kerülni kell a bőrrel való kontaktust, gumikesztyű használata az aszepszis betartása miatt is szükséges. Ha érzékenységre utaló tünetek jelentkeznek, pl. bőrkkiütés, az arc, az ajak és a szemkörnyék duzzanata, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni!

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2008. augusztus 7.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

15.1. Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

15.2. Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

15.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság

4x8 g, 20x8 g vagy 100x8 g polietilén fecskendő, papírdobozban.

15.4. Törzskönyvi szám

710/1997.